NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale

Alcool dichlorobenzylique, amylmétacrésol et lidocaïne

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ce ci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale?
3. Comment utiliser Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale et dans quel cas est-il utilisé?

- Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale est un antiseptique et antidouleur pour les infections de la bouche et de la gorge.
- Strepsils + Lidocaïne est également disponible sous forme de pastilles.
- Strepsils + Lidocaïne est indiqué pour les enfants et adolescents de 12 à 18 ans et pour les adultes pour le traitement des symptômes des affections douloureuses de la bouche et de la gorge, telles que maux de gorge (pharyngites, laryngites) et après intervention chirurgicale au niveau des amygdales.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale.

N'utilisez jamais Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale

- Chez les enfants de moins de 12 ans.
- Si vous êtes hypersensible (allergique) à l'alcool dichlorobenzylique, l'amylmétacrésol, la lidocaïne ou à l'un des autres composants de Strepsils + Lidocaine, solution pour pulvérisation buccale.

Avertissements et précautions

- Si les maux de gorge s'accompagnent de forte fièvre, de maux de tête, de nausées ou de vomissements, ne pas utiliser ce produit plus de 2 jours sans consulter votre médecin.
- Eviter tout contact avec les yeux.
- Chez les personnes sensibles, étant donné l'effet anesthésiant local, il peut y avoir plus de risque d'avaler de travers ou une modification temporaire des sensations dans la bouche.
- Le spray peut être utilisé par les personnes diabétiques.

Autres médicaments et Strepsils + Lidocaïne
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Il n'y a aucune interaction entre Strepsils + Lidocaïne et les antibiotiques; leur utilisation concomitante est donc possible.

Strepsils + Lidocaïne **avec des aliments, boissons et de l'alcool**
Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité
Etant donné qu'on ne dispose d'aucune donnée concrète quant à l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement, la prudence est recommandée pendant cette période.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Vu les caractéristiques du produit, il est improbable que Strepsils + Lidocaïne ait la moindre influence sur la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

Strepsils + Lidocaïne solution pour pulvérisation buccale contient du sorbitol et de l'azorubine (E122)
Si votre médecine vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contractez-le avant de prendre ce médicament.
L'arorubine peut provoquer des réactions allergiques.

3. Comment utiliser Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale ?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Strepsils + Lidocaïne peut être utilisé chez les enfants et adolescents de 12 à 18 ans et chez les adultes..

La dose recommandée est de deux nébulisations, à répéter si nécessaire, toutes les deux heures, avec un maximum de 8 fois par jour.
Mode d'emploi



Placez l'applicateur en position horizontale
dans la bouche, appuyez avec l'index sur la "tête" du spray.
TENEZ TOUJOURS LE FLACON EN POSITION VERTICALE.
La solution pour pulvérisation buccale ne peut être inhalée.

Si aucune amélioration n'est constatée après 3 à 4 jours, il y a lieu de consulter un médecin.

Si vous avez utilisé plus de Strepsils + Lidocaïne que vous n'auriez dû.
Aucun surdosage n'a été observé jusqu'à présent.
Manifestations pouvant survenir en cas de mauvais usage ou de surdosage: anesthésie excessive des voies respiratoires supérieures et digestives, insomnies, agitation, excitation, dépression respiratoire. Une méthémoglobinémie peut également survenir.
Si vous avez pris trop de Strepsils + Lidocaïne, consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).
Prenez cette notice avec vous, elle vous sera utile pour instaurer rapidement un traitement.
Le traitement doit être symptomatique et d'appoint et sous observation médicale. La méthémoglobinémie peut être traitée par une injection intraveineuse immédiate de bleu de méthylène (1-4 mg/kg).

Si vous oubliez d'utiliser Strepsils + Lidocaïne
Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre Strepsils + Lidocaïne
Sans objet

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des effets indésirables apparaissent rarement et ne surviennent en général qu'après un traitement de longue durée (voir mesures à prendre en cas d'utilisation de trop grandes quantités).
- Contrairement à un grand nombre d'analgésiques locaux, la lidocaïne n'induit pas ou peu de réactions d'hypersensibilité. Elles se manifestent sous forme d'érythème, d'une sensation de brûlure ou de picotement dans la bouche ou la gorge ou d'une enflure de la bouche ou de la gorge.
- Le goût peut être influencé.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ce ci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.
Belgique
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Strepsils + Lidocaïne, solution pour pulvérisation buccale ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur sur la plaquette thermoformée et la boîte après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Strepsils+Lidocaïne solution pour pulvérisation buccale.

- Les substances actives sont: 4,46 mg alcool dichlorobenzylique, 2,23 mg amylmétacrésol et 6,0 mg lidocaïne.
- Les autres composants (excipients) sont: éthanol, acide citrique, glycérol, sorbitol, saccharine, menthol, arôme menthe, arôme anis, azorubine (E122), eau.

Aspet de Strepsils+Lidocaïne solution pour pulvérisation buccale et contenu de l'emballage extérieur.

- La solution pour pulvérisation buccale est une solution rouge conditionnée dans un flacon en verre pourvu d'un applicateur pour pulvérisation buccale. Le flacon contient 20 ml (140 nébulisations = 70 doses).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Allée de la Recherche 20
B-1070 Bruxelles
Fabricant:
Famar Nederland B.V.
Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Nederland

Délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE186943

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 02/2014.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2014.